GROUP	1	HERBICIDE	GROUPE	1	HERBICIDE

Nufarm®/MD
Clodinafop Herbicide

Nufarm Agriculture Inc., 5507 1st Street SE, Calgary, Alberta T2H 1H9 1-800-868-5444
24 Hour Emergency Response Number / Numéro d'urgence 24 heures
1-800-424-9300

Nufarm® is a registered trademark of Nufarm Limited.
NufarmMD est une marque déposée de Nufarm Limited.

8 13538 00010 3

(18.4 litre)

Emulsifiable Concentrate

FOR SALE FOR USE IN THE PRAIRIE PROVINCES AND PEACE RIVER, OKANAGAN AND CRESTON FLATS REGIONS OF BRITISH COLUMBIA ONLY.

A post emergence herbicide for control of wild oats, volunteer (tame) oats, green foxtail, yellow foxtail, barnyard grass, Persian darnel and volunteer canary seed in spring wheat and Durum wheat.

COMMERCIAL

CAUTION POISON

WARNING – EYE & SKIN IRRITANT

READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING

REGISTRATION NO. 29962
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

GUARANTEE:
Clodinafop-propargyl ..... 240 g/L

Concentré Émulsifiable

VENTE AUTORISÉE POUR L'EMPLOI DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES ET DANS LES RÉGIONS DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX, D'OKANAGAN ET DES TERRASSES DE CRESTON EN COLOMBIE-BRITANNIQUE SEULEMENT.

Herbicide de postlevée à utiliser dans le blé de printemps et le blé dur pour la suppression de la folle avoine, de l'avoine (cultivée) spontanée, de la sétaire verte, de la sétaire glauque, de l'échinochloa pied-de-coq, de l'ivraie de Perse et des graines de l'alpiste des Canaries spontanée.

COMMERCIAL

ATTENTION POISON

AVERTISSEMENT - IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L'UTILISATION

N° D'HOMOLOGATION 29962
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE:
Clodinafop-propargyl ..... 240 g/L

PRECAUTIONS:
CAUTION – POISON.
WARNING – EYE & SKIN IRRITANT.
HARMFUL IF SWALLOWED OR ABSORBED THROUGH THE SKIN.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

May cause irritation of eyes. Do not wear contact lenses when using. Avoid inhalation of vapour or spray mist DO NOT get in eyes or on skin. Avoid contact with clothing. Do not take internally. Use only in a well ventilated area.

Wear coveralls or long sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves, and goggles when mixing, loading or during equipment clean up or repair. Wash gloves thoroughly with soap and water before removal.

Remove contaminated clothing immediately after use. Store and wash contaminated clothing separately from household laundry before reuse. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking or smoking.

Do not eat, drink or smoke while mixing, loading or during application.

Do not enter or allow worker entry during the restricted entry interval (REI) of 12 hours after application.

If this pest control product is to be used on a commodity that may be exported to the U. S. and you require information on acceptable residue levels in the U. S., visit CropLife Canada's website at: www.croplife.ca.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product contains an aromatic petroleum distillate which is moderately to highly toxic to aquatic organisms. Observe buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats, consider the characteristics and conditions of the site before treatment. Site characteristics and conditions that may lead to runoff include, but are not limited to: heavy rainfall, moderate to steep slope, bare soil, poorly draining soil (e.g. soils that are compacted, fine textured, or low in organic matter such as clay).

Do not apply this product directly to freshwater habitats such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands, estuaries or marine habitats. Do not contaminate irrigation/drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

FIRST AID:
If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give **any** liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.
Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION:
Do not induce vomiting. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically for ingestion and/or skin and eye contact.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS:
For spills or transportation accidents, Chemtrex, 1-800-424-9300.
For health or environmental emergencies, Prosar, 1-877-325-1840.
For product and use information, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444.

STORAGE:
Store in original, tightly-closed container in a cool, dry, well-ventilated room. Do not ship or store near food, feed, seed and fertilizers.

DISPOSAL:
For Recyclable Containers:
Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site.
Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site.
Before taking the container to the collection site:

1) Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsing to the spray mixture in the tank.
2) Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

For Returnable Containers:
Do not reuse this container for any purpose. For disposal, this empty container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).

For Returnable-Refillable Containers:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not reuse this container for any other purpose.

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER:
This pest control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offence under the *PEST CONTROL PRODUCTS ACT* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

PRÉCAUTIONS
ATTENTION - POISON
AVERTISSEMENT - IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.
NOCIF SI INGÉRÉ OU ABSORBÉ PAR LA PEAU.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Peut irriter les yeux. Ne pas porter de lentilles cornéennes pendant l'utilisation.
Éviter d'inhaler la vapeur ou le brouillard de pulvérisation. ÉVITER tout contact avec les yeux et la peau. Éviter tout contact avec les vêtements. Ne pas avaler. Utiliser seulement dans un endroit bien aéré.

Porter une combinaison ou une chemise à manches longues et un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes anti éclaboussures pendant le mélange et le chargement ainsi que pendant le nettoyage et l'entretien de l'équipement. Laver les gants à fond avec de l'eau et du savon avant de les enlever.

Retirer les vêtements contaminés immédiatement après l'utilisation. Laver et ranger les vêtements contaminés séparément des autres vêtements de la maisonnée avant de les remettre. Se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon après avoir utilisé ce produit et avant de manger, de boire ou de fumer.

Ne pas manger, boire ni fumer pendant le mélange, le chargement et l'application.

Ne pas entrer ni permettre à des travailleurs d'entrer dans les zones traitées dans les 12 heures suivant le traitement.

Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada au www.croplife.ca.

RESQUES POUR L'ENVIRONNEMENT:
Ce produit contient un distillat de pétrole aromatique qui est modérément à hautement toxique pour les organismes aquatiques. Respecter les zones tampons précisées à la rubrique MODE D'EMPLOI.

Afin de réduire le ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, examiner les caractéristiques et conditions du site avant d'effectuer le traitement. Les caractéristiques et conditions pouvant favoriser le ruissellement sont, entre autres, mais ne se limitent pas à de fortes pluies, une pente modérée à abrupte, un sol dénudé, un sol mal drainé (p. ex., les sols compactés, de texture fine ou à faible teneur en matière organique, comme l'argile).

NE PAS appliquer ce produit directement sur les habitats aquatiques tels que lacs, rivières, bourbiers, étangs, fondrières des Prairies, ruisseaux, marais, réservoirs, fossés, milieux humides, habitats estuariens ou marins. Ne pas contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation ou potable ni les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement on en éliminant les déchets.

PREMIERS SOINS:
En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement
En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Ne pas provoquer le vomissement. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut entraîner une pneumonie de déglutition. Administrer un traitement symptomatique en cas d'ingestion et/ou de contact avec la peau ou les yeux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE :
Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrex, 1-800-424-9300.
Pour les situations urgentes sur la santé ou l'environnement, Prosar, 1-877-325-1840.
Pour des informations sur les produits et leur utilisation, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444.

ENTREPOSAGE:
Entreposez le produit dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un endroit frais, sec, et bien aéré. NE PAS expédier ou entreposer le produit avec de la nourriture pour humains ou pour animaux, des semences ou des fertilisants.

ÉLIMINATION :
Contenant recyclable :
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'informer auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1) Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans la cuve.
2) Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans la région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants Réutilisables :
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant vide peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant).

Contenants Réutilisables – Rechargeables:
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

08-3775

PRECAUTIONS:
CAUTION – POISON.
WARNING – EYE & SKIN IRRITANT.
HARMFUL IF SWALLOWED OR ABSORBED THROUGH THE SKIN.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

May cause irritation of eyes. Do not wear contact lenses when using. Avoid inhalation of vapour or spray mist DO NOT get in eyes or on skin. Avoid contact with clothing. Do not take internally. Use only in a well ventilated area.

Wear coveralls or long sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves, and goggles when mixing, loading or during equipment clean up or repair. Wash gloves thoroughly with soap and water before removal.

Remove contaminated clothing immediately after use. Store and wash contaminated clothing separately from household laundry before reuse. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking or smoking.

Do not eat, drink or smoke while mixing, loading or during application.

Do not enter or allow worker entry during the restricted entry interval (REI) of 12 hours after application.

If this pest control product is to be used on a commodity that may be exported to the U. S. and you require information on acceptable residue levels in the U. S., visit CropLife Canada's website at: www.croplife.ca.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product contains an aromatic petroleum distillate which is moderately to highly toxic to aquatic organisms. Observe buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats, consider the characteristics and conditions of the site before treatment. Site characteristics and conditions that may lead to runoff include, but are not limited to: heavy rainfall, moderate to steep slope, bare soil, poorly draining soil (e.g. soils that are compacted, fine textured, or low in organic matter such as clay).

Do not apply this product directly to freshwater habitats such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands, estuaries or marine habitats. Do not contaminate irrigation/drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

FIRST AID:
If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give **any** liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION:
Do not induce vomiting. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically for ingestion and/or skin and eye contact.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS:
For spills or transportation accidents, Chemtrex, 1-800-424-9300.
For health or environmental emergencies, Prosar, 1-877-325-1840.
For product and use information, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444.

STORAGE:
Store in original, tightly-closed container in a cool, dry, well-ventilated room. Do not ship or store near food, feed, seed and fertilizers.

DISPOSAL:
For Recyclable Containers:
Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site.
Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site.
Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsing to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

For Returnable Containers:
Do not reuse this container for any purpose. For disposal, this empty container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).

For Returnable-Refillable Containers:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not reuse this container for any other purpose.

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER:
This pest control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offence under the *PEST CONTROL PRODUCTS ACT* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

GENERAL INFORMATION

NUFARM CLODINAFOP Herbicide is a systemic, post-emergence herbicide for the selective control of wild oats, volunteer (tame) oats, green foxtail, yellow foxtail, barnyard grass, Persian darnel and volunteer canary seed in all types of spring wheat and Durum wheat. Do not use NUFARM CLODINAFOP Herbicide on barley, as crop injury will occur. Do not apply this product using aerial application equipment except under conditions specified on this label.

NUFARM CLODINAFOP Herbicide is absorbed by the leaves and is rapidly translocated to the growing points of leaves and stems. Thorough coverage of the plants is essential for consistent control. Actively growing susceptible grasses stop growing within 48 hours of treatment. Depending on species, growing conditions and crop competition, leaves and growing points turn yellow within one to three weeks after application. Further colour changes and loss of vigour will be observed, followed by a browning and complete control three to five weeks after application.

Although NUFARM CLODINAFOP Herbicide does not control broadleaf weeds, NUFARM CLODINAFOP Herbicide can be tank-mixed with a wide range of broadleaf herbicides to provide broad-spectrum weed control in wheat. See section entitled "TANK MIXES of NUFARM CLODINAFOP HERBICIDE WITH BROADLEAF WEED HERBICIDES" and refer to the appropriate Tank Mix section for ground and aerial application.

DIRECTIONS FOR USE:
As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems, DO NOT use to control aquatic pests.

DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

When a tank mixture is used, consult the labels of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) buffer zone of the products involved in the tank mixture.

Avoid application of this product when heavy rain is forecast.

Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a vegetative strip (buffer zone) between the treated area and the edge of the water body.

RESISTANCE-MANAGEMENT RECOMMENDATIONS:
For resistance management, NUFARM CLODINAFOP Herbicide is a Group 1 herbicide. Any weed population may contain or develop plants naturally resistant to NUFARM CLODINAFOP Herbicide and other Group 1 herbicides. The resistant biotypes may dominate the weed population if these herbicides are used repeatedly in the same field. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action, but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist. Appropriate resistance-management strategies should be followed.

To delay herbicide resistance:

- Where possible, rotate the use of NUFARM CLODINAFOP Herbicide or other Group 1 herbicides with different herbicide groups that control the same weeds in a field.
- Use tank mixtures with herbicides from a different group when such use is permitted.
- Herbicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical information related to herbicide use and crop rotation, and considers tillage (or other mechanical), cultural, biological and other chemical control practices.
- Monitor treated weed populations for resistance development.
- Prevent movement of resistant weed seeds to other fields by cleaning harvesting and tillage equipment and planting clean seed.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or integrated weed-management recommendations for specific crops and weed biotypes.
- For further information or to report suspected resistance, contact Nufarm Agriculture Inc. at 1-800-868-5444 or at www.nufarm.ca.

BUFFER ZONES:
The buffer zones specified in the table below are required between the point of direct application and the closest downwind edge of sensitive terrestrial habitats (such as grasslands, forested areas, shelter belts, woodlots, hedgerows, riparian areas and shrublands), sensitive freshwater habitats (such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands) and estuarine/marine habitats.

Method of application	Crop	Buffer Zones (metres) Required for the Protection of:	
		Aquatic Habitat	Terrestrial Habitat
Field sprayer*	Spring wheat and durum wheat	15	0
Aerial	Spring wheat and durum wheat	72	76
*For field sprayer application, buffer zones can be reduced with the use of drift reducing spray shields. When using a spray boom fitted with a full shield (shroud, curtain) that extends to the crop canopy, the labelled buffer zone can be reduced by 70%. When using a spray boom where individual nozzles are fitted with cone-shaped shields that are no more than 30 cm above the crop canopy, the labelled buffer zone can be reduced by 30%.			

For tank mixes, consult the labels of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) buffer zone of the products involved in the tank mixture and apply using the coarsest spray (ASAE) category indicated on the labels for those tank mix partners

APPLICATION AND MIXING INSTRUCTIONS:

MIXING INSTRUCTIONS-GROUND OR AERIAL APPLICATION:

1. Clean spray tank and half fill with clean water. Start agitation or bypass system.
2. If a broadleaf herbicide is to be used, add the product FIRST prior to adding NUFARM CLODINAFOP Herbicide and agitate for 2-3 minutes.
3. Add correct amount of NUFARM CLODINAFOP Herbicide.
4. Agitate for 2-3 minutes.
5. Add correct amount of Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score.
6. Agitate for 1-2 minutes before adding remainder of water and then maintain constant agitation.
7. After any break in spraying operations, agitate thoroughly before spraying again.
8. **Use the spray suspension as soon as it is prepared.**
9. If an oil film starts to build up in the tank, drain tank and then clean with a detergent.

SPRAYING INSTRUCTIONS - GROUND APPLICATION:

1. NUFARM CLODINAFOP HERBICIDE can be applied by ground or air. For aerial application instructions, refer to the section entitled “SPRAYING INSTRUCTIONS - AERIAL APPLICATION” which follows this section.
2. Water Volume: 50 to 100 litres per hectare when applied alone and a minimum of 100L/ha when tank-mixed with broadleaf herbicides
3. Spray Nozzles: 80° or 110° flat fan stainless steel nozzles are recommended for optimal spray coverage. Application of the spray mixture at a 45° angle in the direction of travel will result in improved spray coverage. Use 50 mesh nozzle screens. Do not use flood type nozzles, controlled droplet application equipment, spray foils, or hollow cone nozzles.
4. Pressure: 275-310 kPa.
5. Apply uniformly at 6-8 km/hr and avoid overlapping. Shut off spray boom while starting, turning, slowing or stopping to prevent crop injury from an over application.
6. Do not contaminate streams, rivers, lakes, ponds, wetlands, sloughs, irrigation water, vegetated ditch banks, and water used by livestock or for domestic purposes. Do not apply within 15 meters of a wetland area or any of the aforementioned bodies of water.

SPRAYING INSTRUCTIONS - AERIAL APPLICATION:

1. NUFARM CLODINAFOP Herbicide can be applied by ground or by air. For ground application instructions, refer to the section entitled “SPRAYING INSTRUCTIONS – GROUND APPLICATION” which precedes this section.
2. Water Volume - Aerial application: Minimum of 30 litres per hectare when applied alone or when tank mixed with Buctril M.
3. Ensure uniform application. To avoid uneven or overlapped application, use appropriate marking devices. Do not use human flaggers.
4. Aerial drift is increased under certain meteorological conditions. DO NOT apply during periods of dead calm. Avoid application when winds are gusty. DO NOT apply when wind speed is greater than 15 km/hr at flying height at the site of application. DO NOT apply with spray droplets smaller than the American Society of Agricultural Engineers (ASAE) coarse classification, with a volume medium diameter (VMD) greater than 350 microns. To reduce drift caused by turbulent wingtip vortices, the nozzle distribution along the spray boom length MUST NOT exceed 65% of the wing or rotor-span.
5. When a tank mixture is used, consult the label of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) buffer zone of the products involved in the tank mixture.

SPRAYER CLEAN-UP

1. Thoroughly clean application equipment immediately after spraying. Ensure that all traces of the product are removed. The following recommendations are provided:
2. Drain and flush tank walls, boom and all hoses for ten minutes with clean water. Do not clean the sprayer near desirable vegetation, wells, or other water sources.
3. Remove the nozzles and screens and wash separately.
4. Dispose of all rinsings in accordance with provincial regulations.
5. If a broadleaf tank-mix partner is used, always check tank-mix partner label for any additional clean up procedures.

GENERIC AERIAL APPLICATION LABEL INSTRUCTIONS

Directions for Use

Apply only by fixed-wing or rotary aircraft equipment which has been functionally and operationally calibrated for the atmospheric conditions of the area and the application rates and conditions of this label.

Label rates, conditions and precautions are product specific. Read and understand the entire label before opening this product. Apply only at the rate recommended for aerial application on this label. Where no rate for aerial application appears for the specific use, this product cannot be applied by any type of aerial equipment.

Ensure uniform application. To avoid streaked, uneven or overlapped application, use appropriate marking devices. No human flaggers are permitted.

Use Precautions
Apply only when meteorological conditions at the treatment site allow for complete and even crop coverage. Apply only under conditions of good practice specific to aerial application as outlined in the *National Aerial Pesticide Application Manual*, developed by the Federal/Provincial/Territorial Committee on Pest Management and Pesticides.
Do not apply to any body of water. Avoid drifting of spray onto any body of water or other non-target areas. Specified buffer zones should be observed.

Coarse sprays are less likely to drift, therefore, avoid combinations of pressure and nozzle type that will result in fine particles (mist). Do not apply during periods of dead calm or when wind velocity and direction pose a risk of spray drift. Do not spray when the wind is blowing towards a nearby sensitive crop, garden, terrestrial habitat (such as shelter-belt) or aquatic habitat.

Operator Precautions
Do not allow the pilot to mix chemicals to be loaded onto the aircraft. Loading of premixed chemicals with a closed system is permitted.

It is desirable that the pilot have communication capabilities at each treatment site at the time of application.

The field crew and the mixer/loaders must wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves and goggles or face shield during mixing/loading, cleanup and repair. Follow the more stringent label precautions in cases where the operator precautions exceed the generic label recommendations on the existing ground boom label.

All personnel on the job site must wash hands and face thoroughly before eating and drinking. Protective clothing, aircraft cockpit and vehicle cabs must be decontaminated regularly.

Product Specific Precautions
Read and understand the entire label before opening this product. If you have questions, call the manufacturer or obtain technical advice from the distributor or your provincial agricultural representative.

POST-EMERGENT CONTROL OF WEEDS IN SPRING AND DURUM WHEAT

NUFARM CLODINAFOP Herbicide can be used on all varieties of spring wheat and Durum wheat.
Observe minimum interval to harvest of 60 days after treatment.
Do not apply on barley or any crop other than spring wheat or Durum wheat, as crop damage will result. Do not allow spray to drift to adjacent fields seeded to crops other than spring wheat or Durum wheat.
Do not treat wheat underseeded to forages. Observe a minimum of three (3) days before grazing livestock on crops treated with NUFARM CLODINAFOP Herbicide.

WEEDS CONTROLLED:

Wild Oats,
Green Foxtail,
Barnyard grass,
Volunteer Canary Seed
Volunteer (Tame) Oats,
Yellow Foxtail,
Persian Darnel

TIMING OF APPLICATION:

CROP	GROWTH STAGE	REMARKS
Spring wheat and Durum wheat	Prior to emergence of 4th tiller	When tank-mixing with a broadleaf herbicide always refer to the label of the broadleaf partner prior to use.

WEED	GROWTH STAGE	REMARKS
Wild Oats	1 to 6 leaf stage on main stem	Prior to emergence of 4th tiller.
Volunteer (Tame) Oats	3 to 6 leaf stage on main stem	Prior to emergence of 4th tiller.
Green Foxtail and Yellow Foxtail (wild millet, pigeon grass)	1 to 5 leaf stage on main stem	For optimum control apply prior to emergence of the 3rd tiller and while foxtail is actively growing.
Barnyard grass	1 to 5 leaf stage on main stem	For optimum control apply before tillering, and while barnyard grass is actively growing.
Persian Darnel	1 to 5 leaf stage on main stem	For optimum control apply before tillering, and while Persian darnel is actively growing.
Volunteer Canary Seed	1 to 6 leaf stage on main stem	Prior to emergence of 4th tiller.

- For optimum results, apply NUFARM CLODINAFOP Herbicide to actively growing weeds. An early application will maximize crop yields by reducing weed competition. Weeds emerging after application of NUFARM CLODINAFOP Herbicide will not be controlled.
- Weed control following application of NUFARM CLODINAFOP Herbicide alone or in combination with broadleaf weed herbicides, can be reduced or delayed under stress conditions such as drought, heat, insufficient fertility, flooding or prolonged cool temperatures. Grass escapes or re-tillering may occur if application is made during prolonged stress conditions. Optimum weed control will be obtained if application of NUFARM CLODINAFOP Herbicide is delayed until the stress conditions have ended and weeds are once again actively growing.
- NUFARM CLODINAFOP Herbicide alone can be used 30 minutes before rainfall.
- Do not apply to crop that is stressed by conditions such as frost, low fertility, drought, flooding, disease or insect damage as crop injury may result.

RATE OF USE FOR GROUND APPLICATION:
Apply the recommended rate of NUFARM CLODINAFOP Herbicide and the recommended rate of Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score in a minimum of 50 to 100 L of water per hectare.

NUFARM CLODINAFOP Herbicide ALONE		
Weeds Controlled:	WILD OATS VOLUNTEER (TAME) OATS GREEN FOXTAIL YELLOW FOXTAIL	BARNYARD GRASS VOLUNTEER CANARY SEED
Application Method:	Ground - apply in 50 – 100 litres of water per hectare.	
Application Rate:	230 mL/ha of NUFARM CLODINAFOP Herbicide + 0.25% v/v of Nufarm Enhance or 0.8% v/v of Signal Adjuvant or 0.8% v/v of Score	

NUFARM CLODINAFOP Herbicide ALONE		
Weeds Controlled:	WILD OATS VOLUNTEER (TAME) OATS GREEN FOXTAIL YELLOW FOXTAIL	BARNYARD GRASS VOLUNTEER CANARY SEED PERSIAN DARNEL
Application Method:	Ground - apply in 50 - 100 litres of water per hectare.	
Application Rate:	290 mL/ha of NUFARM CLODINAFOP Herbicide + 1% v/v of Signal Adjuvant or 1% v/v of Score	

RATE OF USE FOR AERIAL APPLICATION:
Apply the recommended rate of NUFARM CLODINAFOP Herbicide and the recommended rate of Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score in a minimum of 30 L of water per hectare.

NUFARM CLODINAFOP Herbicide ALONE	
Weeds Controlled:	WILD OATS
Application Method:	Aerial - apply in a minimum of 30 litres of water per hectare.
Application Rate:	230 mL/ha of NUFARM CLODINAFOP Herbicide + 0.25% v/v of Nufarm Enhance or 0.8% v/v of Signal Adjuvant or 0.8% v/v of Score

NUFARM CLODINAFOP Herbicide ALONE		
Weeds Controlled:	WILD OATS YELLOW FOXTAIL	GREEN FOXTAIL PERSIAN DARNEL
Application Method:	Aerial - apply in 30 litres of water per hectare.	
Application Rate:	290 mL/ha of NUFARM CLODINAFOPHerbicide + 1.0% v/v of Signal Adjuvant or 1.0% v/v of Score	

TANK MIXES:
NUFARM CLODINAFOP Herbicide is recommended in tank mix with other products.
Follow **all instructions** for mixing, spraying precautions, limitations, crop rotations, application timing, pre-harvest intervals etc. on labels of products tank mixed with NUFARM CLODINAFOP Herbicide.

NUFARM CLODINAFOP HERBICIDE WITH BROADLEAF WEED HERBICIDES – GROUND APPLICATION

For the control of: Wild oats, green foxtail, broadleaf weeds:
Consult the label of the tank-mix partner for a list of broadleaf weeds controlled, rates, timing, recropping restrictions, grazing interval restrictions, recommendations for specific weeds, directions for use and precautions and follow the more restrictive label. When tank mixing always add the broadleaf herbicide(s) to the spray tank first; followed by NUFARM CLODINAFOP Herbicide, with Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score added last. For the appropriate rate of NUFARM CLODINAFOP Herbicide with Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score, refer to the `RATE OF USE FOR GROUND APPLICATION' section of the label.

Partner product	Tankmix partner rate	Crop stage[1]
Dyvel* Herbicide Agricultural	1.25 L/ha	2 to 5 leaf
Refine Extra *[2] 75DF Herbicide	20 g/ha	2 leaf to flag leaf
Buctril *M	1.0 L/ha	2 leaf to flag leaf
Mextrol* 450 Liquid Herbicide	1.25 L/ha	2 leaf to flag leaf
Estaprop* Plus Liquid Herbicide / Turboprop* / Dichlorprop*-D	1.75 L/ha	4 leaf to early flag leaf (shot blade)
Lontrel 360EC + MCPA Ester (assume 600 series)	280 - 420 mL/ha 920 mL/ha	3 leaf to flag leaf
Curtail* M	1.5 to 2.0 L/ha	3 leaf to just before flag leaf
Thumper* EC	1.0 L/ha	4 leaf to flag leaf
Approve* Herbicide	1.24 L/ha	4 leaf to flag leaf
2,4-D Amine (assume 600 series)[3]	700 mL to 920 mL/ha	3 leaf to flag leaf
MCPA Amine (assume 600 series)[3]	700 mL to 920 mL/ha	3 leaf to flag leaf
MCPA Ester (assume 600 series)	700 mL to 920 mL/ha	3 leaf to flag leaf
Pardner*	1.0 L/ha	2 leaf to flag leaf
Koril* 235 Liquid Herbicide	1.2 L/ha	2 leaf to flag leaf
Ally* [2]	7.5 g/ha	2 leaf to flag leaf
Attain* Herbicide Tank Mix	600 mL/ha of Attain A + 1.0 L/ha of Attain B	4 leaf to flag leaf

1, Always consult the label of the broadleaf herbicide prior to use.
2, Addition of surfactants other than Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score is not required.
3, A reduction in control of green foxtail and wild oats may be observed when NUFARM CLODINAFOP Herbicide is tank mixed with 2,4-D Amine and MCPA Amine.

Temporary crop injury may occur with tank-mixes under extreme weather conditions or when the crop is suffering from stress due to inadequate or abnormally high moisture levels or extreme temperatures.

Tank mixes with chemical additives, pesticides or fertilizers not listed on this label may be physically incompatible, may cause unacceptable crop effects or may result in unacceptable weed or pest control. Contact Nufarm Agriculture Inc. at 1-800-868-5444 for more information.

NUFARM CLODINAFOP HERBICIDE WITH BROADLEAF WEED HERBICIDES – AERIAL APPLICATION

Consult the label of the tank-mix partner for a list of broadleaf weeds controlled, rates, timing, recropping restrictions, grazing interval restrictions, recommendations for specific weeds, directions for use and precautions and follow the more restrictive label. When tank mixing always add the broadleaf herbicide(s), to the spray tank first; followed by NUFARM CLODINAFOP Herbicide, with Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score added last. For the appropriate rate of NUFARM CLODINAFOP Herbicide with Nufarm Enhance, Signal Adjuvant or Score, refer to the `RATE OF USE FOR AERIAL APPLICATION' section of the label.

Use in a minimum of 30 L of water per hectare.

Partner product	Tankmix partner rate	Crop stage[1]
Buctril *M	1.0 L/ha	2 leaf to flag leaf

1, Always consult the label of the broadleaf herbicide prior to use.

Temporary crop injury may occur with tank-mixes under extreme weather conditions or when the crop is suffering from stress due to inadequate or abnormally high moisture levels or extreme temperatures.

Tank mixes with chemical additives, pesticides or fertilizers not listed on this label may be physically incompatible, may cause unacceptable crop effects or may result in unacceptable weed or pest control. Contact Nufarm Agriculture Inc. at 1-800-868-5444 for more information.

NOTE TO USER: READ THE FOLLOWING BEFORE USING THIS PRODUCT FOR THE INDICATED SPECIAL USE APPLICATIONS

The **DIRECTIONS FOR USE** for this product for the use(s) described on this supplemental Label were developed by persons other than Nufarm Agriculture Inc. and accepted for registration by Health Canada under the User Requested Minor Use Label Expansion program. Nufarm Agriculture Inc. itself makes no representation or warranty with respect to performance (efficacy) or crop tolerance (phytotoxicity) claims for this product when used on the crops listed on this Supplemental Label.

Accordingly, the User assume all risks related to performance and crop tolerance arising, and agree to hold Nufarm Agriculture Inc. harmless from any claims based on efficacy or phytotoxicity in connection the uses described below.

DIRECTIONS FOR USE IN THE OKANAGAN AND CRESTON FLATS REGION OF BC:
NUFARM CLODINAFOP Herbicide can be used for the control of wild oats, green foxtail and yellow foxtail in spring wheat and durum wheat in the Okanagan and Creston Flats Regions of British Columbia. For information on crop and weed stages, rates of application, mixing and spraying instructions and precautions see the appropriate sections elsewhere on this label.

* All products listed are trademarks of their respective companies.

08-3775

PRÉCAUTIONS
ATTENTION - POISON
AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.
NOCIF SI INGÉRÉ OU ABSORBÉ PAR LA PEAU.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Peut irriter les yeux. Ne pas porter de lentilles cornéennes pendant l'utilisation. Éviter d'inhaler la vapeur ou le brouillard de pulvérisation. VITER tout contact avec les yeux et la peau. viter tout contact avec les vêtements. Ne pas avaler. Utiliser seulement dans un endroit bien aéré.

Porter une combinaison ou une chemise à manches longues et un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes anti éclaboussures pendant le mélange et le chargement ainsi que pendant le nettoyage et l'entretien de l'équipement. Laver les gants à fond avec de l'eau et du savon avant de les enlever.

Retirer les vêtements contaminés immédiatement après l'utilisation. Laver et ranger les vêtements contaminés séparément des autres vêtements de la maisonnée avant de les remettre. Se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon après avoir utilisé ce produit et avant de manger, de boire ou de fumer.

Ne pas manger, boire ni fumer pendant le mélange, le chargement et l'application.

Ne pas entrer ni permettre à des travailleurs d'entrer dans les zones traitées dans les 12 heures suivant le traitement.

Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada au www.croplife.ca.

RESQUES POUR L'ENVIRONNEMENT:
Ce produit contient un distillat de pétrole aromatique qui est modérément à hautement toxique pour les organismes aquatiques. Respecter les zones tampons précisées à la rubrique MODE D'EMPLOI.

Afin de réduire le ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, examiner les caractéristiques et conditions du site avant d'effectuer le traitement. Les caractéristiques et conditions pouvant favoriser le ruissellement sont, entre autres, mais ne se limitent pas à de fortes pluies, une pente modérée à abrupte, un sol dénudé, un sol mal drainé (p. ex., les sols compactés, de texture fine ou à faible teneur en matière organique, comme l'argile).

NE PAS appliquer ce produit directement sur les habitats aquatiques tels que lacs, rivières, bourbiers, étangs, fondrières des Prairies, ruisseaux, marais, réservoirs, fossés, milieux humides, habitats estuariens ou marins. Ne pas contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation ou potable ni les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement on en éliminant les déchets.

PREMIERS SOINS:
En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement
En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Ne pas provoquer le vomissement. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut entraîner une pneumonie de déglutition. Administrer un traitement symptomatique en cas d'ingestion et/ou de contact avec la peau ou les yeux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE :
Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrex, 1-800-424-9300.
Pour les situations urgentes sur la santé ou l'environnement, Prosar, 1-877-325-1840.
Pour des informations sur les produits et leur utilisation, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444.

ENTREPOSAGE:
Entreposez le produit dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un endroit frais, sec, et bien aéré. NE PAS expédier ou entreposer le produit avec de la nourriture pour humains ou pour animaux, des semences ou des fertilisants.

ÉLIMINATION :
Contenant recyclable :
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'informer auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans la cuve.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans la région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants Réutilisables :
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant vide peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant).

Contenants Réutilisables – Rechargeables:
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'herbicide NUFARM CLODINAFOP est un herbicide systémique de postlevée pour la suppression sélective de la folle avoine, de l'avoine (cultivée) spontanée, de la sétaire verte, de la sétaire glauque, de l'échinochloa pied-de-coq, de l'ivraie de Perse et des graines de l'alpiste des Canaries spontanée dans tous les types de blé de printemps et de blé dur. Ne pas utiliser l'herbicide NUFARM CLODINAFOP dans l'orge, à défaut de quoi la culture sera endommagée. Ne pas appliquer ce produit à l'aide d'un équipement d'application par voie aérienne, sauf selon les conditions précisées dans cette étiquette.

L'herbicide NUFARM CLODINAFOP est absorbé par les feuilles et rapidement transporté vers les points de croissance des feuilles et des tiges. Il est essentiel de bien couvrir les mauvaises herbes pour obtenir une suppression efficace. Les graminées sensibles en croissance active cessent de se développer dans les 48 heures suivant le traitement. Selon l'espèce, les conditions de croissance et la concurrence de la culture, les feuilles et les points végétatifs jaunissent en une à trois semaines. La décoloration et la perte de vigueur se poursuivent jusqu'au brunissement et à la suppression complète de trois à cinq semaines après l'application.

Bien que l'herbicide NUFARM CLODINAFOP ne supprime pas les mauvaises herbes à feuilles larges, on peut le mélanger en cuve à un vaste éventail d'herbicides contre les mauvaises herbes à feuilles larges pour obtenir un spectre d'activité élargi dans le blé. Voir la section MÉLANGES D'HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP AVEC DES HERBICIDES CONTRE LES MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES et consulter la section appropriée des Mélanges En Cuve pour l'application par voie terrestre et aérienne.

MODE D'EMPLOI :
Puisque ce produit n'est pas homologué pour la suppression des parasites dans les systemes aquatiques. NE PAS l'utiliser pour supprimer les parasites aquatiques.

NE PAS contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation ou potable ni les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

Pour les mélanges en cuve, consulter les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus large (la plus restrictive) requise parmi les produits utilisés dans le mélange.

Éviter d'appliquer ce produit si on annonce de fortes pluies.

On peut réduire la contamination des zones aquatiques causée par le ruissellement en aménageant une bande végétative (zone tampon) entre la surface traitée et la bordure du plan d'eau.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE
Gestion de la résistance à l'herbicide NUFARM CLODINAFOP, herbicide du groupe 1. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à l'herbicide NUFARM CLODINAFOP et à d'autres herbicides du groupe 1. Les biotypes résistants peuvent finir par prédominer au sein de la population si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ.
Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.
Pour retarder l'acquisition de la résistance aux herbicides :
- Dans la mesure du possible, alterner l'herbicide NUFARM CLODINAFOP ou les herbicides du groupe 1 avec des herbicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes mauvaises herbes au champ.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et de la rotation des cultures et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de travail du sol (ou d'autres méthodes mécaniques) ou des pratiques de lutte culturale, biologique et d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Empêcher la propagation à d'autres champs des mauvaises herbes résistantes en nettoyant le matériel de travail du sol et de récolte et en utilisant des semences non contaminées.
- Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Nufarm Agriculture Inc. au 1-800-868-5444 ou à www.nufarm.ca**.**

ZONES TAMPONS
Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans les tableaux ci-dessous séparent le point d'application directe du produit et la rive la plus rapprochée en aval des habitats terrestres sensibles (tels que prairies, forêts, brise-vent, terres à bois, haies, zones riveraines et zones arbustives), des habitats aquatiques sensibles (tels que lacs, rivières, bourbiers, étangs, fondrières des Prairies, ruisseaux, marais, cours d'eau, réservoirs et milieux humides) ainsi que des habitats estuariens ou marins sensibles.

Méthode d'application	**Culture**	**Zones tampons (en mètres) nécessaires à la protection des :**	
		Habitats aquatiques	**Habitats terrestres**
Pulvérisateur de grandes cultures*	Blé de printemps et blé dur	15	0
Pulvérisation par voie aérienne	Blé de printemps et blé dur	72	76
* Dans le cas du pulvérisateur de grandes cultures, on peut réduire la zone tampon en utilisant des écrans protecteurs. Lorsqu'on utilise une rampe de pulvérisation munie d'un écran qui s'étend sur toute sa longueur et jusqu'au couvert végétal, la taille de la zone tampon est réduite de 70 %. Lorsqu'on utilise une rampe dont les buses sont munies d'écrans coniques fixés à moins de 30 cm au-dessus du couvert végétal, la taille de la zone tampon est réduite de 30 %.			

Lorsqu'on emploie un mélange en cuve, il faut prendre connaissance de l'étiquette des autres produits entrant dans le mélange, et respecter la zone tampon la plus large (la plus restrictive) parmi celles exigées pour ces produits et appliquer au moyen de la catégorie de goutelettes la plus grosse (ASAE) indiquée sur les étiquettes des produits d'association.

DIRECTIVES D'APPLICATION ET DE MÉLANGE :

DIRECTIVES DE MÉLANGE – APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE OU AÉRIENNE :
1. Nettoyer le réservoir du pulvérisateur et le remplir à moitié d'eau. Mettre l'agitateur ou le système de dérivation en marche.
2. Si on utilise un herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges, verser le produit EN PREMIER, puis ajouter l'herbicide NUFARM CLODINAFOP et agiter pendant 2 ou 3 minutes.
3. Ajouter la quantité appropriée d'herbicide NUFARM CLODINAFOP.
4. Agiter pendant 2 ou 3 minutes.
5. Ajouter la quantité appropriée Nufarm Enhance, d'adjuvant Signal ou Score.
6. Agiter pendant 1 ou 2 minutes avant d'ajouter le reste de l'eau, puis maintenir une agitation constante.
7. Si la pulvérisation est interrompue, agiter vigoureusement avant de reprendre la pulvérisation.
8. **Utiliser la suspension tout de suite après sa préparation.**
9. S'il commence à se former une pellicule huileuse dans le réservoir, purger le réservoir puis le nettoyer à l'aide d'un détergent.

DIRECTIVES D'APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE
1. L'herbicide NUFARM CLODINAFOP peut être appliqué par voie terrestre ou aérienne. Pour connaître les directives relatives à l'application par voie aérienne, consulter la section DIRECTIVES D'APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE, ci-dessous.
2. Volume d'eau : 50 - 100 litres à l'hectare utilisé seul, et au moins 100 litres à l'hectare pour les mélanges en cuve avec des herbicides contre les mauvaises herbes à feuilles larges.
3. Buses : On recommande l'emploi de buses à jet éventail à 80° ou 110° en acier inoxydable pour une couverture optimale. Les buses peuvent être orientées à un angle de 45° vers l'avant afin d'améliorer la pénétration du feuillage et de fournir une meilleure couverture. Utiliser des tamis de buse de 50 mailles. Ne pas utiliser de buses à miroir, d'applicateur par gouttelettes contrôlées, de buses avec écran directionnel ni de buses en jet à cône creux.
4. Pression : 275-310 kPa.
5. Appliquer uniformément à une vitesse de 6-8 km/h, en évitant le chevauchement des passages. Fermer la rampe au moment du départ, des tournants, des ralentissements ou des arrêts, afin de prévenir les dommages à la culture résultant d'une application excessive.
6. Ne pas contaminer les cours d'eau, lacs, étangs, milieux humides, marécages ou bordures végétalisées des fossés, l'eau d'irrigation ou d'abreuvement du bétail ni l'eau potable. Ne pas appliquer à moins de 15 mètres des milieux humides ou des plans d'eau susmentionnés.

DIRECTIVES D'APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE
1. L'herbicide NUFARM CLODINAFOP peut être appliqué par voie terrestre ou aérienne. Pour connaître les directives relatives à l'application par voie terrestre, consulter la section DIRECTIVES D'APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE, ci-dessus.
2. Volume d'eau pour l'application par voie aérienne : Au moins 30 litres à l'hectare pour utilisé seul ou en mélange avec Buctril M.
3. S'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés. Ne pas utiliser de marqueurs humains.
4. Certaines conditions météorologiques augmentent la dérive aérienne. Ne pas épandre par temps mort, lorsque le vent souffle par rafales ni lorsque les vents soufflent à plus de 15 km/h. Utiliser des buses ou une combinaison de buses et de pressions qui produiront de grosses gouttelettes, d'un diamètre volumétrique moyen supérieur ä 350 microns.
5. Pour les mélanges en cuve, consulter les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus large (la plus restrictive) requise parmi les produits utilisés dans le mélange.

NETTOYAGE DU PULV RISATEUR

1. Nettoyer à fond l'équipement de pulvérisation immédiatement après l'application. S'assurer que toute trace du produit a été éliminée. Marche à suivre recommandée.
2. Vider et rincer le rèservoir, la rampe et toutes les conduites pendant dix minutes avec de l'eau propre. Ne pas nettoyer le pulvérisateur à proximité de végétation que l'on désire conserver, d'un puits ou de toute autre source d'eau.
3. Enlever les buses et les tamis et les laver séparément.
4. liminer tous les résidus de rinçage conformément aux règlements provinciaux pertinents.
5. Si on utilise un herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges, toujours consulter l'etiquette du produit ajouté au mélange pour connaître toute procédure de nettoyage additionnelle.

INSTRUCTIONS GÉNÉRIQUES SUR L'ÉTIQUETTE CONCERNANT L'APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE

Mode d'emploi

Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette.

Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'application à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Utiliser seulement les quantités recommandées pour l'application par voie aérienne qui sont indiquées sur l'étiquette. Si, pour l'utilisation prévue du produit, aucun taux d'application par voie aérienne ne figure sur l'étiquette, on ne peut utiliser ce produit, et ce, quel que soit le type d'appareil aérien disponible.

S'assurer que l'application est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit appliqué de façon non uniforme (application en bandes, irrégulière ou double), utiliser des marqueurs appropriés. L'utilisation des marqueurs humains n'est par permise.

Mises en garde concernant l'application aérienne

Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'application par voie aérienne décrites dans le *Guide National D'apprentissage-application de Pesticides par Aéronef* développé par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides doivent être présentes.

Ne pas épandre de pesticides sur les étendues d'eau. Éviter que la dérive n'atteigne une étendue d'eau ou tout autre endroit non visé. Les zones tampons indiquées devraient être respectées.

Les grosses gouttelettes sont moins sujettes à la dérive; il faut donc éviter les pressions et les types de buses qui permettent la formation de fines particules (brume). Ne pas épandre par temps mort ou lorsque la vitesse du vent et son orientation peuvent provoquer une dérive. Ne pas épandre également lorsque le vent souffle en direction d'une culture, d'un jardin, d'un habitat terrestre (plantations, brise-vent, etc.) ou aquatique vulnérable.

Mises en garde concernant l'opérateur antiparasitaire

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques prémélangés contenus dans un système fermé.

Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'application.

Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des gants, des combinaisons et des lunettes ou un masque les protégeant contre les produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les réparations. Lorsque les précautions qu'on recommande à l'opérateur de prendre sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour application avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus rigoureuses.

Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

Mises en garde propres au produit

Lire attentivement l'étiquette et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler le fabricant ou obtenir des conseils techniques après du distributeur ou d'un conseiller agricole provincial

SUPPRESSION POSTLEVÉE DE MAUVAIS HERBES DANS LE BLÉ DE PRINTEMPS ET LE BLÉ DUR

L'herbicide NUFARM CLODINAFOP peut être utilisé dans toutes les variétés de blé de printemps et de blé dur. Respecter un délai d'attente avant la récolte d'au moins 60 jours après le traitement.
Ne pas appliquer dans l'orge ni dans aucune culture autre que le blé de printemps ou le blé dur, à défaut de quoi la culture sera endommagée. Faire en sorte que le brouillard de pulvérisation ne puisse dériver vers des champs adjacents ensemencés de cultures autres que le blé de printemps ou le blé dur.
Ne pas traiter le blé cultivé avec des plantes fourragères comme culture intercalaire. Respecter un délai d'au moins trois jours avant de laisser paître le bétail dans les cultures traitées avec l'herbicide NUFARM CLODINAFOP.

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES:

Folle avoine	Avoine (cultivée) spontanée
Sétaire verte	Sétaire glauque
Échinochloa pied-de-coq	Ivraie de perse
Graines de l'Alpiste des canaries spontanée	

MOMENT DU TRAITEMENT:

CULTURE	STADE DE CROISSANCE	REMARQUES
Blé de printemps et blé dur	Avant l'émergence de la 4e talle	Pour les mélanges avec un herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges, toujours consulter l'étiquette du produit d'association (herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges) avant l'utilisation.

Mauvaise Herbe	STADE DE CROISSANCE	REMARQUES
Folle Avoine	1 à 6 feuilles sur la tige principale	Avant l'émergence de la 4e talle
Avoine (cultirée) Spontanée	3 à 6 feuilles sur la tige principale	Avant l'émergence de la 4e talle
Sétaire Verte, Sétaire Glauque	1 à 5 feuilles sur la tige principale	Pour une suppression optimale, appliquer avant l'émergence de la 3e talle et pendant la croissance active de la sétaire
Échinochloa Pied-De-Coq	1 à 5 feuilles sur la tige principale	Pour une suppression optimale, appliquer avant le tallage, et pendant la croissance active de l'échinochloa pied-de-coq
Ivraie De Perse	1 à 5 feuilles sur la tige principale	Pour une suppression optimale, appliquer avant le tallage, et pendant la croissance active de l'ivraie de Perse
Graines de l'Alpiste Des Canaries Spontanée	1 à 6 feuilles sur la tige principale	Avant l'émergence de la 4e talle

- Pour un résultat optimal, appliquer l'herbicide NUFARM CLODINAFOP sur des mauvaises herbes en pleine croissance. Une application hâtive permettra de maximiser le rendement de la culture en réduisant la concurrence exercée par les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes qui lèvent après l'application de l'herbicide NUFARM CLODINAFOP ne seront pas supprimées.
- Lorsque les mauvaises herbes sont stressées par une sécheresse, la chaleur, une fertilité faible, un excès d'eau ou des températures froides prolongées, l'efficacité du traitement risque d'être réduite ou retardée après l'application de l'herbicide NUFARM CLODINAFOP, seul ou en association avec un herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges. Il peut se produire des échappées de traitement ou un nouveau tallage si l'application est effectuée dans des conditions de stress prolongé. On obtiendra une

suppression optimale si l'application de l'herbicide NUFARM CLODINAFOP est retardée jusqu'à ce que les conditions de stress soient terminées et que les mauvaises herbes aient repris leur croissance active.

- L'herbicide NUFARM CLODINAFOP utilisé seul peut être appliqué 30 minutes avant la pluie.
- Ne pas appliquer sur une culture stressée par des conditions telles que le gel, une fertilité faible, une sécheresse, un excès d'eau, une maladie ou des dommages causés par des insectes, à défaut de quoi la culture pourrait être endommagée.

DOSES D'EMPLOI POUR L'APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE

Appliquer la dose recommandée d'herbicide NUFARM CLODINAFOP et Nufarm Enhance, l'adjuvant Signal ou Score dans au moins 50 à 100 litres d'eau à l'hectare.

NUFARM CLODINAFOP Herbicide SEULEMENT	
Mauvaises herbes supprimées :	FOLLE AVOINE AVOINE (CULTIVÉE) SPONTANÉE SÉTAIRE VERTE SÉTAIRE GLAUQUE ÉCHINOCHLOA PIED-DE COQ GRAINES D'ALPISTE DES CANARIES SPONTANÉE
Méthode d'Application:	Terrestre - appliquer avec 50 – 100 litres d'eau par hectare.
Taux d'application :	230 mL/ha d'herbicide NUFARM CLODINAFOP + 0,25% v/v de Nufarm Enhance ou 0,8% v/v d'adjuvant Signal ou 0,8% v/v de Score

NUFARM CLODINAFOP Herbicide SEULEMENT		
Mauvaises herbes supprimées :	FOLLE AVOINE AVOINE (CULTIVÉE) SPONTANÉE SÉTAIRE VERTE SÉTAIRE GLAUQUE	ÉCHINOCHLOA PIED-DE-COQ GRAINES D'ALPISTE DES CANARIES SPONTANÉE IVRAIE DE PERSE
Méthode d'Application:	Terrestre - appliquer avec 50 - 100 litres d'eau par hectare.	
Taux d'application :	290 mL/ha d'herbicide NUFARM CLODINAFOP + 1% v/v d'adjuvant Signal ou 1% v/v de Score.	

DOSES D'EMPLOI POUR L'APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE

Appliquer la dose recommandée d'herbicide NUFARM CLODINAFOP et Nufarm Enhance, d'adjuvant Signal ou SCORE dans au moins 30 litres d'eau à l'hectare.

NUFARM CLODINAFOP Herbicide SEULEMENT	
Mauvaises herbes supprimées :	FOLLE AVOINE
Méthode d'Application:	Aérienne - dans au moins 30 litres d'eau à l'hectare.
Taux d'application :	230 mL/ha of NUFARM CLODINAFOP Herbicide + 0,25% v/v de Nufarm Enhance ou 0,8% v/v d'adjuvant Signal ou 0,8% v/v de Score

NUFARM CLODINAFOP Herbicide SEULEMENT		
Mauvaises herbes supprimées :	FOLLE AVOINE SÉTAIRE GLAUQUE	SÉTAIRE VERTE IVRAIE DE PERSE
Méthode d'Application:	Aérienne - dans au moins 30 litres d'eau à l'hectare.	
Taux d'application :	290 mL/ha of NUFARM CLODINAFOP Herbicide + 1,0% v/v d'adjuvant Signal ou 1,0% v/v de Score	

MÉLANGE EN RÉSERVOIR:

L'herbicide NUFARM CLODINAFOP est recommandé en mélange en réservoir avec d'autres produits.

Suivez **toutes les instructions** pour mélange, précautions de pulvérisateur, limitations, rotations pour culture, temps d'application, intervalle de pré-récolte, etc. sur l'étiquette de produit mélange en réservoir pour l'herbicide NUFARM CLODINAFOP.

L'HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP AVEC DES HERBICIDES CONTRE LES MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES – APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE

Pour la suppression de la folle avoine, de la sétaire verte, des mauvaises herbes à feuilles larges :

Consulter l'étiquette du produit à mélanger pour connaître les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées, les doses d'emploi et le moment du traitement, les directives particulières quant aux cultures de rotation et aux délais d'attente avant de laisser paître le bétail, les recommandations relatives à des mauvaises herbes particulières, le mode d'emploi et les précautions, et se conformer à l'étiquette la plus restrictive. Pour la préparation des mélanges en cuve, toujours ajouter les herbicides contre les mauvaises herbes à feuilles larges en premier lieu, suivis de l'herbicide NUFARM CLODINAFOP avec Nufarm Enhance, l'adjuvant Signal ou Score. Pour connaître la dose appropriée d'herbicide NUFARM CLODINAFOP et Nufarm Enhance, et adjuvant Signal ou Score, consulter la section « Doses d'emploi pour l'application par voie terrestre » de l'étiquette.

Produit d'association	**Dose d'emploi du produit d'association en réservoir**	**Stade de croissance de la culture[1]**
Dyvel* Herbicide Agricole	1,25 L/ha	De 2 à 5 feuilles
Refine Extra *[2] 75DF Herbicide	20 g/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard
Buctril *M	1,0 L/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard
Herbicide Liquide Mextrol* 450	1,25 L/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard
Estaprop* Plus Herbicide Liquide/ Turboprop* / Dichlorprop*-D	1,75 L/ha	De 4 feuilles au début du stade de la feuille étendard (phase d'épiaison)
Lontrel 360EC + MCPA Ester (formulation 600)	280 - 420 mL/ha 920 mL/ha	De 3 feuilles à la feuille étendard
Curtail* M	1,5 à 2,0 L/ha	De 3 feuilles à juste avant la sortie de la feuille étendard
Thumper* EC	1,0 L/ha	De 4 feuilles à la feuille étendard
Herbicide Approve*	1,24 L/ha	De 4 feuilles à la feuille étendard
2,4-D Amine (formulation 600)[3]	700 mL à 920 mL/ha	De 3 feuilles à la feuille étendard
MCPA Amine (formulation 600)[3]	700 mL à 920 mL/ha	De 3 feuilles à la feuille étendard
MCPA Ester (formulation 600)	700 mL à 920 mL/ha	De 3 feuilles à la feuille étendard

Pardner*	1,0 L/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard
Herbicide Liquide Koril* 235	1,2 L/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard
Ally* [2]	7,5 g/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard
Mélange herbicide Attain*	600 mL/ha de Attain A + 1,0 L/ha de Attain B	De 4 feuilles à la feuille étendard

1. Toujours consulter l'étiquette de l'herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges avant l'emploi.
2. L'ajout d'agents tensioactifs autres que Nufarm Enhance, l'adjuvant SIGNAL ou Score n'est pas requis.
3. On pourrait observer une réduction de la suppression de la sétaire verte et de la folle avoine si L'HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP est utilisé en mélange avec du 2,4-D Amine ou MCPA Amine.

La culture pourrait subir des dommages temporaires après le traitement avec ces mélanges s'ils sont appliqués lorsque les conditions climatiques sont extrêmes ou lorsque la culture souffre d'un stress causé par une humidité inadéquate ou anormalement élevée ou par des températures extrêmes.

Les mélanges en réservoir avec des additif chimiques, des pesticides ou des engrais qui ne sont pas mentionnés sur cette étiquette peuvent être physiquement incompatibles, peuvent causer des effets inacceptables sur les cultures ou risque d'entraîner une suppression inacceptable des mauvaises herbes ou des organismes nuisibles. Communiquer avec Nufarm Agriculture inc. au 1-800-868-5444 pour plus de renseignements.

MÉLANGES D'HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP AVEC DES HERBICIDES CONTRE LES MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES – APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE

Consulter l'étiquette du produit à mélanger pour connaître les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées, les doses d'emploi et le moment du traitement, les directives particulières quant aux cultures de rotation et aux délais d'attente avant de laisser paître le bétail, les recommandations relatives à des mauvaises herbes particulières, le mode d'emploi et les précautions, et se conformer à l'étiquette la plus restrictive. Pour la préparation des mélanges, toujours ajouter l'herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges en premier lieu, suivi de l'herbicide NUFARM CLODINAFOP avec Nufarm Enhance, l'adjuvant SIGNAL ou Score pour terminer. Pour connaître la dose appropriée d'herbicide NUFARM CLODINAFOP et Nufarm Enhance, d'adjuvant SIGNAL ou Score, consulter la section « DOSES D'EMPLOI POUR L'APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE » de l'étiquette.

Utiliser au moins 30 L d'eau à l'hectare.

Produit d'association	**Dose d'emploi du produit d'association en réservoir**	**Stade de croissance de la culture[1]**
Buctril *M	1,0 L/ha	De 2 feuilles à la feuille étendard

1. Toujours consulter l'étiquette de l'herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges avant l'emploi.

La culture pourrait subir des dommages temporaires après le traitement avec ces mélanges s'ils sont appliqués lorsque les conditions climatiques sont extrêmes ou lorsque la culture souffre d'un stress causé par une humidité inadéquate ou anormalement élevée ou par des températures extrêmes.

Les mélanges en réservoir avec des additif chimiques, des pesticides ou des engrais qui ne sont pas mentionnés sur cette étiquette peuvent être physiquement incompatibles, peuvent causer des effets inacceptables sur les cultures ou risque d'entraîner une suppression inacceptable des mauvaises herbes ou des organismes nuisibles. Communiquer avec Nufarm Agriculture inc. au 1-800-868-5444 pour plus de renseignements.

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT DE SOUMETTRE CE PRODUIT À DES UTILISATIONS SPÉCIALES

LE MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites sur l'étiquette supplémentaire, a été établi par des personnes autres que Nufarm Agriculture Inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Nufarm Agriculture Inc. ne formule aucune allégation et n'offre aucune garantie quant au maintien de l'efficacité du produit ou à la résistance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce produit est appliqué sur la culture mentionnée ci-dessous.

En conséquence, l'utilisateur accepte toute responsabilité des effets de l'utilisation du produit, et libère Nufarm Agriculture Inc. de toute réclamation relative à l'efficacité et(ou) à la phytotoxicité du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée ci-dessous.

MODE D'EMPLOI DANS LES RÉGIONS D'OKANAGAN ET DES TERRASSES DE CRESTON EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

L'herbicide NUFARM CLODINAFOP peut être utilisé pour supprimer la folle avoine, la sétaire verte et la sétaire glauque dans le blé de printemps et le blé dur dans les régions de l'Okanagan et des terrasses de Creston en Colombie-Britannique. Consulter les sections appropriées de cette étiquette pour de l'information sur les stades de croissance des cultures et des mauvaises herbes, les doses d'emploi, les directives de mélange et d'application et les précautions.

* Tous les produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs fabricants respectifs.

08-3775

NOTES